


令和6年度 浜名湖プランクトン・海況調査速報 No.6

地点	水深(m)	水温(℃)	塩分	珪藻※	有害・有毒 プランクトン
内浦湾	0.0	30.8	22.6	△	発生なし
	2.0	30.5	25.2		発生なし
	4.0	29.9	28.3		発生なし
細江湖	0.0	31.2	21.1	△	発生なし
	2.0	30.8	23.3		発生なし
	4.0	29.7	28.3		ディノフィシス属 (10細胞/mL) ゴニオラックス属 (10細胞/mL)
湖心	0.0	30.3	20.2	○	発生なし
	2.0	30.1	20.3	△	発生なし
	4.0	29.8	27.6		発生なし
	6.0	29.6	29.8		発生なし
猪鼻湖	0.0	30.3	4.9	△	発生なし
	2.0	30.5	12.7		発生なし
	4.0	29.7	27.2		発生なし
松見ヶ浦	0.0	31.0	16.7	△	発生なし
	2.0	30.7	17.0		発生なし
新所	0.0	30.2	22.0	×	発生なし
鷺津	0.0	30.1	19.7	○	発生なし
	2.0	30.0	19.7		発生なし
新場	0.0	29.7	28.4	△	発生なし
	2.0	29.4	29.8		発生なし
平松	0.0	30.9	17.9	○	発生なし
	2.0	30.7	20.2		発生なし
白洲	0.0	30.0	17.1	○	発生なし
	1.5	30.1	17.6		発生なし
雄踏	0.0	29.5	22.1	△	発生なし
塩田	0.0	29.2	30.1	○	発生なし
湖口	0.0	29.0	30.8	○	発生なし
新居	0.0	29.2	25.1	△	発生なし

※ ◎：多い ○：中程度 △：少ない ×：極めて少ない(または無し)

調査日：9月10日(火)

提供日：令和6年9月11日(水)
静岡県水産・海洋技術研究所浜名湖分場
(TEL 053-592-0139)



※ ディノフィシス属 (渦ベン毛藻・有毒)：下痢性貝毒の原因種とされる。

※ ゴニオラックス属 (渦ベン毛藻・有害)：大量発生し赤潮を形成すると、貧酸素による魚介類のへい死が懸念される。

○ 細江湖において、有害・有毒プランクトンが確認されました。現在の密度では、**注意・警戒が必要なレベルではありません**が、引き続き動向に注意していきます。

○ 珪藻は、多くの地点で少ない状態です。