令和7年度 浜名湖プランクトン・海況調査速報 No.4

地点	水深(m)	水温(℃)	塩分	珪藻 [※]	有害・有毒 プランクトン	調査日:7月1日(火)
内浦湾	0.0	29. 5	25. 8	0	(TEL 053-592-0139) 発生なし 松見ケ浦 内浦湾	静岡県水産·海洋技術研究所浜名湖分場
	2. 0	29. 4	28. 1			
	4. 0	25. 2	30. 7			
細江湖	0.0	31. 2	23. 9	Δ		
	2. 0	30. 2	27. 2			
	4. 0	29. 7	27. 6			
湖心	0.0	29. 2	27. 8	Δ		
	2. 0	29. 4	27. 9			松見ケ浦
	4. 0	29. 1	27. 9			
	6.0	24. 7	28. 1			
猪鼻湖	0.0	31.1	17. 4	O 		
	2. 0	29.8	22. 0			
	4. 0	26.0	28. 6			
松見ヶ浦	0.0	29.8	25. 3			
	2. 0	29. 5	26.8			
新所	0.0	29. 2	27. 2	×		
鷲津	0.0	29. 5	26. 7	Δ Δ ⊚ Ο		新所
	2. 0	29.3	26. 8			
新場	0.0	25. 5	33.0			
	2. 0	25. 0	33. 3			
平松	0.0	31.7	23. 5			
	2.0	30.9	25. 8			
白洲	0.0	29. 3	17. 9			'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	1.4	29. 5	26. 5			新場しし推改●人
雄踏	0.0	26. 9	30.6	×		新居
塩田	0.0	24. 5	33.6	×		
湖口 新居	0.0	24. 8	33. 3	×	-	
新店	0.0	26. 6	31.3	X		塩田
	※ ◎ :	多い 〇:中程	度 △:少ない	×:極めて少な	い(または無し)	湖口

- 有害・有毒プランクトンは確認されませんでした。
- 珪藻は、内浦湾・猪鼻湖・庄内湖以外は少ない状態でしたが、<u>湖北部を中心に無害の渦べん毛藻の一種</u> (プロロセントラム・ミニマム)が、多く確認されました。これらは貝類等の餌になっていると思われます。
- 水温は、湖北部を中心に30℃前後に上昇してきました。